

## › QUAND AURAI-JE LES RÉSULTATS ?

Le résultat est transmis par le laboratoire directement à votre médecin qui vous contactera.

Selon le type d'analyse, il faut compter de quelques jours à quelques semaines pour obtenir les résultats.

## › LE RÉSULTAT OBTENU EST-IL FIABLE ?

Oui, le risque d'erreur est minime. Dans certaines circonstances peu fréquentes, le résultat doit être confirmé soit par la réalisation d'un caryotype chez vous et votre conjoint, soit par une nouvelle amniocentèse.

› Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter le site internet du CHL :

[www.chl.lu](http://www.chl.lu)

Ou contactez le secrétariat au 4411 3230

## DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

CHL Maternité

Tél : 4411 11

Nos équipes médico-soignantes sont présentes tout au long de votre grossesse et vous accompagnent dans ce cheminement vers la naissance de votre enfant.

Notre personnel qualifié et formé peut répondre à vos doutes et interrogations sur cette technique.

Flyer Amniocentese Mars 2020

## AMNIOCENTÈSE OU PONCTION DE LIQUIDE AMNIOTIQUE

DÉPARTEMENT DE  
GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE



 **CHL**

  Centre Hospitalier de Luxembourg  
**MATERNITÉ**

CHL Maternité  
2, rue Pierre Federspiel L-1512 Luxembourg  
Tél : +352 44 11 11 Fax : +352 44 11 37 56  
[www.chl.lu](http://www.chl.lu)

 **CHL**

  Centre Hospitalier de Luxembourg  
**MATERNITÉ**

# L'AMNIOCENTÈSE OU PONCTION DE LIQUIDE AMNIOTIQUE

L'amniocentèse est une procédure utilisée couramment en diagnostic prénatal qui consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique (liquide entourant le bébé) dans lequel se trouvent des cellules du bébé qui peuvent être examinées pour rechercher certaines infections foetales ou des anomalies chromosomiques et des maladies héréditaires.

## › COMMENT PRATIQUE-T-ON L'AMNIOCENTÈSE ?

L'amniocentèse est effectuée par ponction à travers la paroi abdominale de la maman. La ponction est sous contrôle échographique permanent, ce qui permet de choisir avec précision l'endroit le plus favorable de prélèvement du liquide et éviter toute blessure du fœtus.

Dans ces conditions et sauf cas particulier, le prélèvement est obtenu dans 99 % des cas dès la première ponction.

La quantité de liquide, prélevé avec une fine aiguille montée sur une seringue, est de 15 ml en moyenne.

## › L'EXAMEN EST-IL DOULOUREUX ?

Non, cet examen est très peu douloureux équivalent à une prise de sang ou à une injection intramusculaire.

## › L'AMNIOCENTÈSE EST-ELLE DANGEREUSE ?

L'amniocentèse réalisée par des praticiens entraînés est un geste sûr, pratiquement dénué de tout risque.

En théorie, le risque est celui d'une fausse-couche, due à une infection, ce qui justifie les précautions de stérilité prises lors du prélèvement.

Lorsque très exceptionnellement survient cette fausse-couche, elle se produit dans les jours suivant le prélèvement. Le risque statistique théorique est de 1 sur 1000 ponctions. Dans notre expérience, ce risque est moindre.

## › COMMENT SE DÉROULE L'AMNIOCENTÈSE ?

- On pratique une échographie abdominale.
- La peau est désinfectée, un drap stérile est placé autour de la zone de ponction.
- La ponction proprement dite dure environ 30 secondes.

Il est inutile d'être à jeun et il n'est pas nécessaire que votre vessie soit remplie.

Votre conjoint peut assister et se trouver à vos côtés lors de l'amniocentèse. La présence d'enfant est interdite dans la salle d'examen.

## › PRÉCAUTIONS AVANT L'EXAMEN

- Prendre une douche le matin de l'examen.
- Signaler la prise de médicaments anticoagulants (aspirine, etc).
- Apporter votre carte de groupe sanguin le jour de l'examen et la lettre de votre médecin s'il en a fait une.

## › CONSEILS POUR APRÈS L'EXAMEN

Le jour de la ponction, vous devez vous reposer et ne pas travailler. Si vous le souhaitez, nous vous donnerons un certificat d'arrêt de travail à remettre à votre employeur.

Nous vous conseillons de rester au calme et de vous reposer le reste de la journée.

Le lendemain vous pouvez reprendre vos activités de manière normale.

Cependant, si le jour même ou les jours suivants votre amniocentèse :

- vous perdez du liquide amniotique par voie vaginale,
- vous avez mal au ventre,
- vous avez de la fièvre,

› vous devez revenir à la Maternité à n'importe quel moment ou contacter votre gynécologue traitant.